

		Pathologie	Frequentie gebruik ICU, personeel, producten (0 tot 10)	Duurtijd belasting ICU personeel, producten (0 tot 10)	Duurtijd belasting klassieke hospitalisatie (0 tot 10)
	Pediater				
Urgentiegraad 1	Onmiddellijk, acuut, levens-, orgaan- of lidmaatbedreigend	<u>PATHOLOGIE/problematiek</u> Endocrinologie: Acidocetose en endocriene decompensatie Cardiologie: Hartfalen. Hartritmestoornis Neuropediatrie: Epilepsie Oncologie: Chemotherapie Sikkelcelcrisis Febriële neutropenie Depressieve stoornis, vooral bij adolescenten Luchtweginfecties en NKO-infectie met koorts Astmacrisis Acute abdominale pijn Gastro-enteritis Dehydratatie Pyelonefritis Metabole ziekten Geelzucht	7 10 5 2 2	5 6 5 2 4	3 10 10 15 2 2 2 3 2 3

		Septische shock Meningitis Malaise Syncope 8 Anafylactische shock 5 Koorts bij ziek kind zonder duidelijke oorzaak na telefonisch contact 2 Ongeruste ouder die na telefonisch contact niet is gerustgesteld <u>INTERVENTIES</u> Cardio: Aangeboren hartafwijking met cyanose of linker obstructieve afwijkingen 10 Neonatologie: chirurgie voor aangeboren 10 spijsverteringsafwijkingen en andere 20 Gastro: Interventionele endoscopie 1			5 3 2 10 20 5	10 4 2 10 20 5
Urgentiegraad 2	Acuut, deteriorerend, mogelijk levens-, orgaan- of lidmaatbedreigend	<u>PATHOLOGIE/problematiek</u> Epilepsie zonder status epilepticus Metabole ziekten. Geelzucht			5 à 10 3	

	Interventie in orde van uren	<p>Gastro: pre-transplant leveronderzoek</p> <p>Cardio: verdachte malaise, Kawasaki-ziekte, myocarditis</p> <p>Endocrino: vermoedelijke deficiëntie</p> <p>Hersenschudding</p> <p>Gewichtsverlies</p> <p>Behandeling pasgeborene met koorts</p> <p>10</p> <p><u>INTERVENTIES</u></p> <p>Gastrohepato: levertransplantatie</p>	4	4	4 à 20
			2	2	2
			2	5	5
				15?	20
Urgentiegraad 3	Versneld Interventie in orde van dagen	<p><u>PATHOLOGIE/problematiek</u></p> <p>Neurologische stoornis/neuro-ontwikkelingsstoornis met of zonder psychiatrische stoornis</p> <p>Obstructieve stoornis bovenste luchtwegen met polysomnografisch onderzoek</p> <p>Bilan spijsverteringsstoornis: bilan subacute abdominale pijn</p>			7 à 15 2 à 4

		Excessief huilen. RGO (gastro-oesofagale reflux). Coeliakie Diabetes opvolging en materiaal	1		
		Cardio: echografie hartgeruis Ernstige anorexie Oncologie/chemotherapie Astma Hartscreening Endocriene stoornis Hypothyreoïdie Genetische syndromen Dermatologische infecties en urticaria Groeistoornis Antenatale diagnose			2
		<u>INTERVENTIES</u> Aangeboren hartafwijking met cyanose of niet-kritieke obstructieve afwijkingen	10	6?	10
		NKO-heelkunde voor obstructief syndroom	1	4	2 à 5
		Plastische chirurgie gespleten gehemelte Gastro: diagnostische endoscopie	5?	5?	10 1

Electief A	<p>Aandoening die op een termijn van enkele maanden indien niet behandeld kan leiden tot schade aan gezondheid <3md</p> <p>Gepland, rekening houdend met ziekenhuiscapaciteit en nodige flexibiliteit voor capaciteitsconversie</p>	<p><u>PATHOLOGIE/problematiek</u></p> <p>Neuro-ontwikkelingsstoornis met of zonder psychiatrische stoornis.</p> <p>Bilan doorverwijzing psychiatrie versus gespecialiseerde instelling.</p> <p>Neurologische opvolging</p> <p>Periodieke opvolging</p> <p>zuigeling < 2 jaar en kind met screening doofheid, hartafwijking, orthopedische afwijking, visus, psychosociale evaluatie, screening mishandeling</p> <p>Vaccinaties</p> <p>Endocrien: opvolgen en stabiliseren van de behandeling</p> <p>Cardio: niet-dringende hartuis en ergospirometrie, en opvolging aangeboren hartafwijkingen</p> <p>Nefrologische, orthopedische, pneumologische, gastro-enterologische, neurologische,</p>			7 à 15

		reumatologische, dermatologische opvolging e.a. vasculaire aandoeningen Gastro: endoscopie en leverbiopsie Chronische abdominale pijn Behandeling obesitas anorexie Allergie Opvolging astma Groeiachterstand Urologische opvolging (enuresis, reflux,...) Vermoeden van endocriene stoornis Opvolging syndroom Immuunbalans Dermatologische opvolging (e.a. eczeem)			2 à 4
		<u>INTERVENTIES</u> Aangeboren hartafwijking zonder onmiddellijke gevolgen	10	10	7 à 21

Electief B	COVID-19 crisis Gelet op geringe impact op gezondheid uitstelbaar zonder onmiddellijke planning >3md	<u>PATHOLOGIE/problematiek</u> Opvolging stabiele chronische aandoening en nieuwe niet-dringende patiënten (telefonische trriage)			

Voorbehoud: deze lijst is een oriënterende en ondersteunende lijst. Er is een blijvende verantwoordelijkheid van de clinicus die moet rekening houden met de specificiteiten (bv comorbiditeiten) van de patiënt én met de actuele en voorspelde capaciteit en veiligheidscontext van het ziekenhuis. De flexibiliteit van reconversie van capaciteit in het kader van mogelijke COVID- 19 heropflakkingen, moet in rekening gebracht worden (zie antwoord uitgebreid Bureau Hoge Raad Artsen d.d. 19.04.2020).

Het voorstel veronderstelt het openstellen van consultaties mits garanties voor alle veiligheidsmaatregelen (inclusief registry van beschikbare middelen).

Tele-consultaties worden gestimuleerd, ondermeer voor triage en verwijzingen door HA voor patiënten met onduidelijke klachten.

Uitleg bij de tabel:

*PATHOLOGIE: hier telkenmale voor uw specialiteit een niet-limitatieve lijst van specifieke aandoeningen of pathologiegroepen indien mogelijk liefst in volgorde van frequentie van voorkomen.

**INTERVENTIES: betreft alle diagnostische en therapeutische tussenkomsten al dan niet met noodzaak tot narcose

° Urgentiegraad 1:

Betekent urgentie in die mate dat de diagnostische uitwerking en behandeling voorrang heeft op alle andere activiteit die desnoods hiervoor wordt stilgelegd (onmiddellijk)

°°Urgentiegraad 2:

Betreft elke diagnostische of therapeutische tussenkomst die van zodra mogelijk en binnen programma moet kunnen doorgaan. Het bestaande dagschema kan desnoods worden aangepast of verlengd (zelfde dag)

°°° Urgentiegraad 3:

Betreft diagnostische of therapeutische handelingen die zo snel mogelijk moeten worden gepland op korte termijn (<1week).

+ Electief A

Diagnostische en therapeutische handelingen die leiden tot een plan van aanpak van de ziekte eventueel in stappen maar zo te plannen dat er geen kans vermindering voor de patiënt volgt, rekening houdende met de capaciteit van het ogenblik (met voorrang de Urgentiegraden 1, 2 en 3).

Afwerking in te schatten en noodzakelijk <3 maanden

++ Electief B

Diagnostische en therapeutische handelingen die niet bedreigend zijn voor de gezondheid op korte of middellange termijn.

Kunnen gezien worden voor advies zonder dat concrete planning mogelijk is binnen periode 3 maanden.

Kunnen wel doorgaan in geval van overcapaciteit in de gezondheidsinstellingen.

Wat betreft de kolommen "frequentie" en verwachte "duurtijd" in het gebruik van de ICU en hospitalisatieduur zal ad hoc in parallel door de hoofddarts in overleg de praktische uitwerking moeten worden vastgesteld naar gelang de mogelijkheden.

De enquête peilt enkel naar een score tussen 0 en 10 om een en ander duidelijker in beeld te brengen.